흡연과 구강질환

양달님 · 박용덕*

경희대학교 치과대학 예방/사회
치과학교실접수일 : 2014년 12월 17일
수정일 : 2015년 1월 2일
승인일 : 2015년 1월 5일*교신저자 : 박용덕
경희대학교 치과대학 예방/사회
치과학교실
서울시 동대문구 회기로 26
☎ 130-701
Tel: 02-961-0344
Fax: 02-964-2002
E-mail: iam2875@khu.ac.kr

Smoking and Oral Diseases

Dal-Nim Yang, Yong-Duk Park*

Department of Preventive and Social Dentistry, Institute of Oral Biology, School of Dentistry, Kyung Hee University, Seoul, Korea

In this study, the harm of smoking was explained only in the dental area, because there have already been a lot of research works over the danger of smoking in the whole medical area. Particularly, the change of oral organization, the oral disease, the bad influence over oral disease treatment, and the social expense resulted from smoking are suggested. It is the purpose of this study to make known the appropriateness of that a dentist could also be an expert of smoking cessation treatments. The oral organization is affected by smoking directly. Furthermore, dentists have lots of opportunities to contact with oral disease patients, so dentists could apprehend the harm of smoking very well. In the result of one survey, many people said a dentist was the most appropriate expert who persuades a smoker to stop smoking. Thus, dentists could be an expert of smoking cessation treatments like doctors and nurses. Because of the demands above, the pre-step of insurance service is started in March 2015. However, most dentists lack of experience as an expert of smoking cessation treatments relative to doctors and nurses. Therefore, it is needed to design the manual and standard of smoking cessation treatments through the Association of Korean Dentists. Eventually, we would describe a summary of past research related to smoking and dental problems logically and propose a basis that can act as a smoking consultant to dentists.

Key Words: Smoking; Oral diseases; Smoking hazards

Copyright © 2015 by Journal of the Korean Society for Research on Nicotine and Tobacco.

서 론

흡연의 1차적 수단은 구강이다.(1) 흡연으로 발생하는 일산화탄소, 니코틴, 타르 등은 구강을 거쳐 호흡기와 혈류를 통하여 전신으로 확산된다. 이 중 타르는 구강에서 치아변색과 착색을 일으키며, 이로 인하여 거칠어진 치아 표면은 음식물 잔사를 누적시켜 치태 형성을 촉진시킨다. 치태는 일정 시간동안 타액의 무기질에 의해 치주질환을 일으키는 원인인자인 치석으로 석회화된다.(2) 또한 구강병에 있어서 흡

연은 치료 결과에 직접적인 원인과 영향을 미친다. 흡연자가 치주질환, 임플란트, 발치, 구취, 미백 등의 진료를 받을 경우 흡연에 의한 직접적인 영향 때문에(3) 금연과 금주를 1차적으로 권유 받는다. 대부분의 환자들은 치료 기간 동안 자신의 오랜 습관일지라도 결과를 위해 치과의사의 권고를 받아들인다.

흡연자들이 시도할 수 있는 금연방법으로는 약물치료, 전문가의 금연상담, 자가 금연 그리고 이들 방법을 복합적으로 병행하는 것 등이 있다. 김대현 등의 연구에 따르면, 전문가

의 금연권고는 상담을 통해 흡연자의 금연 성공률을 10%까지 향상시킬 수 있고, 약물과 행동요법을 포함한 금연치료는 성공률을 30-50%까지 향상시킬 수 있다고 하였다.(4) 이렇듯 흡연은 질병이라는 규정과 더불어 질병치료에 전문가의 의료행위가 필요한 만큼, 흡연자에 대한 전문가의 진료와 상담이 요구되는 현실에서 치과의료에서의 흡연관련성을 질병발생과 치료과정, 결과 또한 질병으로 발생하는 사회적 비용 등으로 구분하여 정리할 필요가 있다.

따라서 본 연구에서는 국내외의 흡연으로 인한 구강질환과 관련된 선행 연구들을 체계적으로 정리하여, 현재 한국의 의료사회에서 진행되고 있는 의사와 간호사 중심의 금연 진료에서 치과의사들의 금연상담과 진료에 대한 사회적 책임을 추가함으로써 향후 치과의료영역에서도 금연진료 방법과 보험화 정책에 도움을 제공하고자 한다.

본 론

1. 흡연에 따른 구강 내 연조직 변화

담배연기를 흡입할 때 구강 내에 순간적으로 전달되는 750°C의 반복적이고 장기적인 고열로 인해, 입천장에서는 Stomatitis nicotina (Pipe smoker's palate) 병소가 유발될 수 있다.(5,6) 뿐만 아니라 고열과 함께 담배 연기 내의 타르, 일산화탄소, 니코틴, 암모니아, 부탄, 비소, 카드뮴, 청산가리 등의 독성물질은 구강의 방어 세포를 괴사 혹은 중독시켜 면역작용을 떨어뜨리며, 구강 내 말초혈관을 수축시켜 혈류량 감소와 산소 공급의 부족을 초래하여 구강질환의 발생률을 높이고 창상 치유를 방해한다.(7) 이때 흡연은 약물의 대사에 관여하는 간의 cytochrome P450에 영향을 줌으로 치과 처방 약물에 대한 약효를 떨어뜨려 치유 기간을 더욱 길게 한다.(8) 또한 장기적인 흡연은 원주상피를 중증편평상피세포로 화생시켜 정상 기능을 발휘하지 못하게 하며, 이로써 감기 노출이 용이하거나 감기에 걸려도 쉽게 낫지 않아 만성 기관지염으로 발전되기 쉽다.(9) 더구나 혀에 분포하는 4가지 종류의 유두 가운데 미각세포를 함유하는 3종의 유두가 지속적인 흡연 열에 의해 변성 혹은 각화되거나 죽게 되면 미각 상실이 초래되고,(10) 비교적 드문 현상이지만 오랜 흡연이나 약물 등으로 사상유두가 과성장을 하면서 흑모설이 초래되어 흡연자 특유의 구취를 발생시키기도 한다. 특히 이러한 구취는 혈류를 따라 전신으로 순환되기 때문에 잇

솔질에도 불구하고 타인에게 지속적인 불쾌감으로 작용하여 대인관계를 어렵게 하기도 한다.(11)

흡연은 연조직에 과각화나 백반증 같은 전암 단계 혹은 구강암을 발생시키기도 하는데, 입안의 혀, 혀 밑바닥, 볼 점막, 잇몸, 입천장, 후구치 삼각, 입술 등에 발생하는 것을 구강암으로 총칭한다. 일반적으로 알려진 구강암의 위험요인으로 흡연, 음주, 바이러스, 방사선이나 자외선, 식습관과 영양 결핍, 유전적 감수성 등이 있다.(12,13) 구강암은 발생 빈도 순으로 설암, 구순암, 구강저암, 협점막암, 치은암 등으로 열거할 수 있다. 구강암 중 50% 정도로 가장 많은 발생을 차지하는 설암은 대부분 만성 흡연자에게서 나타난다. "Opium smoker's tongue"이라는 혀에 나타난 각화성 병소를 방지할 경우 설암으로 진행되는 데, 치료 후 예후가 아주 불량하며, 악성도가 높고 타 조직으로 전이도 용이하므로, 장기간의 흡연자들에게는 매우 위험하다.(14) 구순암의 경우, 주로 파이프 담배를 이용하는 노년층에서 발생한다. 그 형태는 주로 입술에서 방추세포암이나 선상편평상피암의 형태로 나타나나 외과적인 절제로 치료가 용이하지만 재흡연 시 즉시 재발을 일으킨다.(15) 구강저암의 경우도 파이프 담배나 시거 담배를 장기간 사용 시 주로 발생된다. 이는 악하림프절로 전이가 용이하여 특히 주의가 필요하다.(16) 협점막암은 씹는 담배나 betel nut를 장기간 사용하는 노년층에서 발생률이 높다.(17) 미국 암협회의 조사에 의하면, 흡연자의 경우 비흡연자에 비하여 구강암에 걸릴 위험성이 2배 이상 증가된다.(18) 구강암 환자의 약 72%가 흡연자였으며 이 중 약 60%가 하루에 한 갑 이상 흡연을 했다는 보고도 있다.(19) 위와 같이 흡연과 구강암 발생은 밀접한 관련성을 가지고 있다.(19,20) 이 외에도 흡연에 의해 반복적으로 오므리는 입술은 구각주름을 만들고 쉽게 피부노화에 이르게 한다.(21)

2. 흡연과 치주질환

구강 내 대다수의 상주균과 치아우식균, 치주질환균(대표적인 예, *P. gingivalis*) 등은 음식물과 함께 식도로 넘어가지만, 타르의 높은 접착성은 음식물이라는 세균의 영양분을 구강에 저류시키며, 동시에 세균 자신이 구강 내에 오랫동안 붙어서 활동할 수 있는 환경을 만든다. 특히 음식물 중 당류는 치아우식균(*S. mutans*)이 섭취하여 산을 배출하는데, 이러한 산이 치아우식증을 야기한다. 또한 타르에 의해 치아나 치주조직에 붙게 된 세균들은 치태(Plaque)형성을 돕고, 형

성된 치태는 수 일 동안 세균 집락의 특징을 변화시키는데, 초기에는 통기성 세균인 치아우식균이 집락하다가 4-5일 이후부터 혐기성 치주질환균으로 변화된다. 더구나 치태는 타액의 무기질에 의해 일정시간 후 치석(Dental calculus)으로 석회화되는데, 이 과정에서 타르는 치석을 더욱 치아에 단단히 고정시키는 시멘트 작용을 한다.(1) 흡연은 협점막 세포에 영향을 주어 이하선의 기능을 감소시켜 구강건조증도 유발시킨다. 이러한 환경에서는 타액의 연화작용과 윤활작용이 떨어져 표면이 거친 치석이 생기고, 음식물의 잔류시간 연장을 초래함으로써, 결국 다발성 치아우식증과 치주질환이 야기된다.(22) 2007년도 국민영양조사에 따르면, 현재 치주질환은 ‘비흡연자’ 군 보다도 ‘과거흡연자, 현재 흡연자’ 군에서 6.7%, 15.5%가량 높았다(표 1). 또한 미국 질병관리본부(CDC)의 조사에서도 흡연자는 비흡연자보다 치주염 발생 위험이 4배-6배 높은 것으로 나타났기 때문이다.(23)

흡연으로 변성되고 탄력이 감소된 구강조직이나 치주조직 내부로 치석이 파고들어 누적됨으로서 점차 깊은 치주낭을 만들고 틈 사이를 더욱 넓혀 치아를 지지하는 뼈와 조직의 상실로 이어지며, 결국 치아 동요나 탈락의 원인이 되기도 한다. 흡연으로 인한 갑작스런 치아 탈락은 출혈을 동반하지 않고, 치아뿌리에 치주조직이 모두 소실되며, 표면이 아주 매끄러운 형태로 빠지는 것이 특징이다.(24) 앞서 언급했듯이, 담배연기를 흡입할 때 발생하는 열과 각종 화학물은 구강의 연조직 막과 표면 세포를 손상시키거나 사멸시키고, 사멸된 세포는 치태처럼 축적되어 만성 치은염을 유발할 수 있다. 특히 방어 세포 중독과 상실로 인해 경미한 잇몸질환도 중대한 잇몸질환으로 급속히 발전하게 된다.(25) 대표적인 예가 Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis (Vincent's infection)이다. ANUG는 유리치은 변연부와 치은용기, 치

간유두에 호발하며, 금속 맛을 느끼고 두통이나 불쾌감을 느끼는데, 스트레스나 흡연 등이 주원인으로 나타난다.(1)

3. 흡연에 따른 구강 내 경조직 변화

흡연은 치아의 표면에 타르를 누적시켜 흡연타르라 불리는 착색이 유발되며, 이는 흡연의 상태나 양에 따라 치아면 전체로 착색된다. 부모의 흡연에 따른 간접적인 영향으로도 유치의 법랑질 형성 부전이나 변색이 나타날 수 있다.(26) 흡연 시 생기는 반복적·규칙적 음압은 치아 교정력 보다 훨씬 큰 힘으로서 치조골 후퇴 및 골밀도 저하를 초래한다.(24) 뿐만 아니라 성장기 청소년 흡연자의 경우 일시적이고 반복적인 음압으로 인하여 구개 형태를 변화시켜 예정된 골격 성장이 이루어지지 않고 인위적인 음압에 의한 구개골 형성과 이로 인한 치열의 부정 교합이 야기된다. 장기간 흡연 시 담배 연기가 상악동에 미칠 수 있는 유해 작용은 비강을 통해 상악동 기저부 세포와 인후두부 호흡기 상피세포의 기능을 무력화시켜 상악동염과 상기도 감염은 물론 심한 경우에는 만성 기관지염으로 이행되기도 한다.(27)

위와 같은 기전으로 여러 가지 연구물과 서적을 정리하고 임상적인 결과를 종합하여 흡연이 구강에 미치는 영향을 간략히 요약하면 구강 건조증, 치태 및 치석 형성, 치아 착색과 변색 및 구강점막 멜라닌세포 축적, 호흡기 세포의 화생으로 인한 면역 기능 감소, 창상 치유 장애, 잦은 치은-치주 질환, 치조골 소실과 치은 퇴축에 따른 자연적인 치아 발거, 임플란트 골유착 실패, 피부의 탄력소실로 얼굴 주름, 미각 상실, 구취, 구각 부위 주름, 구개 형태 변화와 부정교합, 상악동염, 상기도 감염, 기관지염, 구강점막 각화증과 백반증, 구내염, 구강암 등으로 정리할 수 있다.(28)

Table 1. Smoking prevalence of periodontal disease in adults (Above 19 years).

State	Total		Men		Women	
	Persons	%	Persons	%	Persons	%
Non smoking*	1,610	68.9	200	71.2	1,410	68.4
Past smoking [†]	569	75.6	446	76.4	123	72.2
Current smoking [‡]	551	84.4	484	85.1	67	78.3

*Non smoking: Lifelong non smoker. [†]Past smoking: past- smoker but current- non smoker. [‡]Current smoking: Current smoker.

Values are presented as National Health and Nutrition Examination (2007).

4. 흡연이 구강질환 치료결과에 미치는 악영향

흡연이 구강진료결과와 관계되는 대표적인 내용으로서 구강 내 창상 치유의 지연, 치아 임플란트 치료의 실패, 구취 유발, 치아미백치료 방해 등 직접적인 악영향을 초래한다. 즉, 흡연이 순환 면역계에 영향을 주고 정상 세포 기능에 손상을 주어 창상치유를 방해하여 항체 반응을 변화시키며, 또한 대식 세포 수의 감소, T 임파구 변화, T-helper 임파구의 수적인 감소로 면역 체계의 혼란을 야기하기 때문에 악영향이 나타나는 것이다.(29) 담배 연기 속의 일산화탄소는 헤모글로빈과의 결합 친화성이 산소보다 200배나 더 커서 일산화탄소와 헤모글로빈이 결합하는 카복시-헤모글로빈이 되어 헤모글로빈의 산소 운반 능력을 저하시키고 말초 부위에 도달하는 산소량 감소로 손상 받은 조직의 재생을 지연시킨다. 따라서 흡연 상태에서 발치나 치주치료, 임플란트 수술을 받게 되면 치유 속도 및 과정에 악영향을 줌으로 금연은 치과 치료 과정과 그 이후에도 반드시 주의·권고되어야 하는 사항이다.(30,31) 특히 치아 임플란트 수술 후 흡연을 하게 되면 주기적이고 강한 음압과 담배 연기 내의 화학 성분에 의해 임플란트 식립체(fixture) 부착 세포들의 괴사를 유발하므로 흡연은 임플란트 치료의 가장 큰 실패 요인이다.(32) 치아 임플란트에 대한 흡연의 악영향으로는 ① 이식된 임플란트 주위의 혈류량이 흡연에 의한 혈관수축으로 감소되고 혈류장애가 생긴다. 또한 카복시-헤모글로빈에 의해 임플란트 주변의 산소공급이 저해되어 골 유착이 방해를 받게 된다. ② 흡연으로 인한 관류 혈류량의 감소는 수술로 손상된 후 빠른 재생을 필요로 하는 수술부위로 들어가야 될 영양소나 아스코르빈산의 농도를 저하시켜 골 유착을 방해한다. ③ 흡연은 정상 뼈와 임플란트 사이에 형성되어야 하는 새로운 뼈의 형성을 지연시켜서 초기 고정력을 떨어뜨린다. ④ 흡연은 임플란트 성공률과 밀접한 관계가 있는 골밀도를 감소시킴으로써 불량한 골질을 초래시킨다. ⑤ 흡연으로 인해 교원질 합성이 감소되고 염기성 인산분해 효소 활성화도 저하로 골질이 약화된다. 그러므로 이러한 기전에 의해 흡연은 임플란트의 실패확률을 현저히 높이므로 수술 전에 금연은 반드시 권고되어야 한다.(33,34)

치아의 법랑질은 무기질, 유기질, 수분으로 구성되어 있으며, 이 중 유기질로 인해 투과 성질을 갖고 있어 외부의 물질이 치아 내로 이동하는 것이 가능하다. 미백에 사용되는 성분은 과산화수소, Carbamide peroxide, Sodium perbo-

rate 등이며, 주로 사용하는 미백제인 Carbamide peroxide는 구강 내에서 Hydrongen peroxide와 urea로 분해되고, Hydrongen peroxide는 산소를 방출하게 된다.(35) 이 산소는 공기 중의 산소와는 달리 아주 반응성이 높아 치아 내로 침투해서 색이 진한 탄소 고리 화합물을 색이 밝은 사슬구조로 바꾸는 원리로 치아 미백이 진행된다. 미백 후 치질은 삼투성이 증가되어 있는 상태이며, 이온의 치질 내 이동이 쉬우므로 흡연 시 평소보다 착색의 위험성이 높으며, 이 외에도 담배 연기 속의 암 유발 인자들이 미백제와 만나게 되면 발암 효과가 증가된다는 연구도 있다.(36)

5. 흡연이 원인인 전신질환

흡연으로 인한 전신질환 관계성은 WHO에서 제시한 2005년도 자료를 참고할 수 있을 것이다(표 2). 우리나라에서도 보건복지부와 중앙 암 등록 본부에 의하여 비슷한 의미의 조사 결과가 2012년도에 발표된 바 있다(표 3). 표 3은 우리나라 주요 암 발병의 위험 요인 기여도(위험요인기여도: 전체 인구집단에서 발생한 특정 질병 가운데 특정 요인이 작용해 발생했다고 간주되는 분율)를 나타낸 것이며, 이를 통해 흡연과 암 발생의 상관 정도를 짐작할 수 있다. 우리나라 주요 암 중 구강암과 인두암에서의 흡연 위험 요인 기여도는 37.2%, 42.0%으로 후두암과 폐암을 제외하고 가장 높다. 인두는 위쪽이 막히고 앞이 비강과 구강으로 뚫린 파이프 모양으로 상부기도 소화관의 뒤쪽에 위치한다. 해부학적으로 인두 내벽은 흡연 시 발암물질이 밀접하게 접촉할 수 있는 부위이며, 인두에 발생하는 가장 흔한 종양은 편평상피세포암으로 담배에 존재하는 수많은 발암 물질이 인두 점막에 만성적으로 접촉하면서 점막 세포의 변이를 초래하고 세포의 무절제한 성장으로 인하여 발생된다.(37,38) 흡연자는 비흡연자에 비해 비인두암은 약 2배, 구강과 후두 인두암은 4-5배 발병률이 높으며, 구강과 인두를 포함하여 두경부암 환자의 약 85%가 흡연과 관련이 있다.(39)

6. 흡연으로 인한 사회적 비용

미국의 사례를 보면, 흡연자의 평생 추가 의료비는 5,000억 달러(한화 약 500조 원, 1달러=1,000원)로 파악되며,(40) 흡연자의 의료비가 연간 50억 달러(한화 약 5조 원)에 달한다.(41) 우리나라의 경우, 2006년 흡연으로 인해 소실된 사회적 비용은 최소 4조 8,860억 원에서 최대 5조 9,381억 원으

Table 2. Matrix of risk factors and chronic diseases in WHO global info-base.

Risk factor	Condition disease				
	Cardiovascular	Diabetes	Cancer	Oral/dental	Chr. obstructive pulmonary
Tobacco use	○		○	○	○
Alcohol use	○	○	○	○	
Nutrition	○	○	○	○	
Obesity	○	○	○		○
Blood glucose	○	○	○		
Physical inactivity	○	○	○		
Raised blood pressure	○	○			
Dietary fat/blood lipids	○	○	○		

Values are presented as Poul E et al. Oral health information systems: towards measuring progress in oral health promotion and disease prevention (2005).

Table 3. The main risk factors of cancer in Korea (2012) (%).

Category	Smoking	Drinking	Infection	Over weight	Lack of physical activity	Childbirth/Hormone	Total
Oral	37.2	20.9	3.0	-	-	-	51.8
Pharynx	42.0	37.8	39.4	-	-	-	78.2
stomach	19.4	-	76.2	-	-	-	80.8
Intestines	0.9	6.9	-	6.7	0.8	-	14.6
Liver	19.0	3.4	61.8	-	-	-	70.1
Pancreas	15.5	-	-	3.3	-	-	18.4
Occiput	70.3	24.4	-	-	-	-	77.5
Lung	46.5	-	-	-	-	-	46.5
Breast	-	0.2	-	8.2	8.8	18.0	31.5
Uterus	0.5	-	95	-	-	-	100
Ovary	4.0	-	-	-	-	32.4	35.1
Kidneys	5.2	-	-	16.8	-	-	21.2
Cancer	11.9	1.8	20.1	1.8	0.7	1.6	33.8

Values are presented as department of Health and Human Services, Central Cancer Registry Division. National Cancer Registry statistics presentation (2007).

로 추정되고 있으며, 흡연으로 인한 건강보험 의료비용이 1999년 3조 2천억 원(약 32억 달러)에서 2003년 4조 1천억 원(약 41억 달러)로 27% 증가하였다고 보고되고 있다.(42,43) 또한 흡연으로 인한 구강질환의 사회적 비용을 추계하기 위하여 전국 11개 치과대학 부속 병원에서 2009년부터 2011년 3월까지 내원한 환자 중 흡연으로 인해 구강질환이 발생한 환자들의 치료 초기부터 종료까지 진료비를 추적한 연구도 있다.(44) 그 결과, 흡연 관련 구강질환으로 인한 의료보험 비용의 상승폭도 사회·경제적 손실에 큰 몫을 차지함을 알 수 있다(표 4). 흡연으로 인한 구강암 진료에 따른 직접적인 소요비용이 연간 12억 달러였으며, 이는 인구 8천만 명의 통일 독일의 경우와 유사했다.(45) 흡연으로 인해 발생한 진료

비 외 사회·경제적 비용의 상관관계를 살펴보면(표 5), ‘금연을 위한 연간 소요비용’이 높을수록 ‘흡연을 위한 외출로 인한 생산성 저하 지수’와 ‘흡연으로 인해 발생하는 월간 주관적 상실비용’이 높게 나타났으며, ‘금연 시도 시 받는 스트레스 지수’가 높을수록 ‘흡연을 위한 외출로 인한 생산성 저하 지수’도 높게 나타났다. 또한 ‘흡연 외출로 인한 생산성 저하 지수’가 높을수록 ‘흡연으로 인해 발생하는 월간 주관적 상실비용’이 높게 나타나 통계적으로 유의한 양의 상관관계를 보인 조사결과도 있었다.(44)

7. 금연 치료 전문가로서의 치과의사 역할

흡연의 질환 유발 병리기전과 역학 관계가 알려지면서,

Table 4. Costs due to oral diseases caused by smoking in Korean (won).

Oral Disease	%	Health care cost every year	Per capita distribution of disease	Estimated cost*
Periodontitis	40.7	20,085,069	820,320	16,476,183,802,080
Stains/Halitosis	36.9	13,899,847	743,730	10,337,733,209,310
Dental caries	18.6	12,049,591	374,888	4,517,247,070,808
Oral Cancer	3.8	16,651,150	76,590	1,275,311,578,500

*Total Person x Dental Utilization x Diseases Ratio x Annual Medical fee.

Values are presented as Park YD, Kang JO et al. Estimation of the costs of smoking- related oral disease: a representative South Korean study. International Dental Journal (2012).

Table 5. Correlation of social and economic costs due to smoking (Except medical fee).

	Annual costs for smoking	Stress level in accordance with smoking	Reduced productivity index due to go out for a smoking	Monthly loss cost caused by smoking
Annual costs for smoking	1			
Stress level in accordance with smoking	.160	1		
Reduced productivity index due to go out for a smoking	.218*	.296 ⁺	1	
Monthly loss cost caused by smoking	.459 ⁺	.112	.431 ⁺	1

*P<0.01, ⁺P<0.001.

Values are presented as Park YD, Kang JO et al. Estimation of the costs of smoking- related oral disease: a representative South Korean study (2012).

Table 6. Smoking patterns of health care provider (%).

Medical Doctor*			Dentist ⁺			Adult [‡]		
Total	Men	Women	Total	Men	Women	Total	Men	Women
29.9	34.9	2.3	24.6	29.8	1.1	27.7	47.7	7.4

*SEO HG. 6th Asia Pacific Conference Presentations on Tobacco Control (2000). ⁺Park YD, Lauren L et al. Smoking prevalence and attitude toward anti-smoking activities among Korean dentists (2008). [‡]Ministry of Health and Welfare. National Health and Nutrition Survey (2008).

기호품이라는 개념에서 바뀌어 ‘재발하기 쉬우나 반복 치료를 통해 완치될 수 있는 니코틴 의존적 만성 질환’으로 정의되고 있다.(46) 질병으로서의 흡연에 대한 인식은 의사의 적절한 치료를 통해 질환을 퇴치할 수 있다는 과학적 규정을 뜻한다. 오래 전부터 보건 의료인의 흡연자에 대한 관심과 상담은 지속되어온 바, 한국에서도 흡연자에 대한 보건 의료인의 적절한 진료 단계가 표준화되어야 할 시점이며, 적극적인 흡연환자의 금연치료에 접근할 때이다.(47) 지난 2008년 헬스로그에서 ‘의료인의 흡연, 어떻게 이해하시나요?’라는 주제로 일반인에게 설문조사를 실시하였다. 그 결과 환자들 중 32.1%에서 ‘흡연 의료인으로부터 진료 받은 경험이 있다’고 응답하였으며, ‘의료인의 흡연 여부를 냄새로 구분 가능

했다’라고 응답한 사람이 67.4%였다. 흡연 의료인에게 진료 받은 느낌에 대해서는 44.3%에서 ‘불쾌하다’, ‘신뢰가 없어진다’라고 응답하였다.(48) 이를 통해 의료인의 흡연율과 의료행위는 상당한 상호작용이 있음을 확인할 수 있으며, 더불어 금연 치료 전문가로서 의료인의 흡연율과 우리나라 성인의 흡연율 차이를 비교하기 위해 표 6을 제시하였다. 이는 2008년에 조사된 흡연율 자료이며, 의사 흡연율 또한 동일한 시점의 자료를 얻고자 하였으나, 조사 시점에 대한 한계로 모집단을 대표할 수 있는 선행연구 중 2007년도 대한가정 의학회지에 발표된 연구 자료를 활용하였다.(49)

한국소비자연맹이 2007년 7월부터 9월까지 2개월간 수도권 병의원을 이용한 환자 1,144명을 대상으로 시행한 조

사에 따르면, 금연에 가장 설득력 있다고 생각하는 사람으로 의료인이 37.6%로 나타나 가족(28.5%), 금연자(21.1%)보다 의료인의 금연 권유가 가장 큰 영향을 주는 것으로 조사되었다.(50) 서흥관 등의 ‘우리나라 의사 흡연을 및 흡연행태’ 연구에서도 일반인들을 대상으로 ‘의료인은 지식이 없는 대중에게 흡연에 대해 설명해야 한다’는 질문에 비흡연자의 90.3%, 과거흡연자의 90.7%, 흡연자의 80.1%가 ‘강력히 동의하거나 동의한다’고 응답하였다.(49) 이로써 의료인의 금연 권고에 대한 대중의 요구도와 필요성을 확인할 수 있다. Chestnutt 등의 연구에서 복미치과의사들을 대상으로 설문 조사한 결과, 응답자의 54.7%가 환자의 금연에 치과의사들도 적극적인 상담자 역할을 해야 한다고 주장하였다.(51) Johnson 등 역시 치과의사도 흡연환자에 대한 1차적인 금연 상담이나 치료 역할자로서 활동해야 한다고 주장하였다.(52,53)

결 론

일반인에게 금연을 진단·권고하고 흡연을 치료하는 데 있어 치과의사 또한 의사·간호사와 더불어 적합한 전문 직업군으로 사료된다. 특히, 박의 대한예방치과학회학술대회 발표자료에 의하면 “치과의사의 간단한 금연 권유가 흡연자의 금연율을 5-10%로 높일 수 있고, 더욱 적극적으로 노력하면 20-36%까지의 금연효과를 거둘 수 있다”고 하였다.(54) 이를 바탕으로 치과에 내원하는 흡연자에게 적극적으로 금연을 권유한다면 흡연자의 금연 성공률을 높이는 데 많은 기여를 할 수 있을 것이라 생각된다.

치과 진료는 보통 20분 이상의 시간이 소요되며, 치과의사와 위생사의 긴밀한 협력으로 직무 분업화가 이루어지고 있다. 이러한 의료 시스템 안에서 치과 의료진은 진료 시 대화나 상담을 통해 쉽게 환자의 병력이나 기호 등에 쉽게 접근할 수 있으므로, 의사·간호사와 더불어 치과의사 역시 흡연 진단 및 치료의 접근이 필요할 것이라 생각된다.(47,52)

이미 환자의 대다수가 흡연이 치과 진료에 미치는 악영향을 어느 정도 인지하고 있으며, 특히 발치, 치주치료, 임플란트 등의 예후에 직접적인 영향이 있음을 인지하고 있다. 그러므로 치과의료기관에서 흡연의 지속적인 관리가 중요하며, 치과의사 역시 의사·간호사와 더불어 국민의 건강 및 금연 성공률 향상을 위해 전문 직업인으로 사회적 책임을 가

질 필요성이 있다고 사료된다.(1,55)

요 약

의과 영역에서의 흡연 위해성에 관한 연구는 이미 활발히 진행되고 있기에, 이 논문에서는 치과 영역에서 흡연에 의한 위해성에 대해 기술하였다. 흡연에 의한 위해성으로는 구강연·경조직 변화, 흡연을 원인 요소를 하는 구강질환, 구강질환 치료결과에 미치는 악영향, 흡연으로 인한 사회 경제적 비용 등을 제시하였다. 이를 통해 금연 치료 전문가로 활동하고 있는 의사, 간호사와 더불어 치과의사 또한 금연 치료 전문가로서의 적절성과 당위성을 제시하고자 하였다.

구강은 흡연이 시작되는 일차적인 수단이기에, 타 장기에 비해 흡연 시 발생하는 열과 연기로 복합적이고 직접적으로 악영향을 받는 기관이다. 그러므로 치과질환자에 있어 흡연은 진료의 직접적인 방해 요소가 된다. 반면 치과 영역은 진료의 특성상 타과에 비해 환자와 접촉할 수 있는 시간이 길다. 이는 치과의사와 환자 간의 충분한 상담이 가능한 환경적인 요인을 제공한다.

더불어 일반인을 대상으로 금연 치료 전문가에 대한 설문 조사를 시행한 적이 있다. 이 조사에서도 역시 ‘금연에 가장 설득력 있다고 생각하는 사람’으로 의료인을 지명하였으며, 의료인의 흡연에 대한 설명 요구도도 높게 조사되었다. 그러므로 치과의사 역시 의사·간호사와 더불어 효율적인 금연 상담 및 치료자로 적합하다.

이러한 관점과 요구로 인하여 2015년 2월부터 흡연자의 개별소비세로 금연상담료가 지불되는 건강보험화 전단계가 의료계에서 시작된다. 그러나 현직의 치과의사들은 금연 치료 전문가로서의 피교육, 자료 및 경험이 의사·간호사에 비해 현저히 부족하다. 그러므로 대한치과의사협회를 통한 금연 치료의 매뉴얼 개발과 교육 및 상담의 표준화를 단기간에 체계화시키는 노력이 무엇보다 필요한 시점이다.

References

1. Park YD. Smoking and oral diseases. yakup. 2008 January 1. Korean.
2. Inaba Y, Ohkubo T, Uchiyama S, Kunugita N. Determination of amounts of tar, nicotine, carbon monoxide, and tobacco-specific nitrosamines in the fillers of and mainstream smoke from privately imported cigarettes. Nihon Eiseigaku Zasshi. 2014; 69(3): 205-10.

3. Dental Health Policy Research of Dental Association. Tobacco is far, Toothbrush close. Issue report:4; 2014.
4. Kim DH, Suh YS. Smoking as a Disease. Korean J Fam Med. 2009; 30: 494-502.
5. Bhatt AP. Case of the month. Stomatitis nicotina. J Indian Dent Assoc. 1984 Jun;56(6): 10-9.
6. Koopman PA. Stomatitis nicotina. Ned Tijdschr Tandheelkd 1979 Sep;86(9): 317- 20.
7. Zitterbart PA, Barr EB, Marlin DC. Stomatitis nicotina: a review and case report. J Indiana Dent Assoc. 1986 Jul-Aug;65(4): 27-9.
8. Fisher AA. Contact stomatitis. Dermatol Clin. 1987 Oct;5(4): 709-17.
9. Reddy CR, Kameswari VR, Ramulu C, Reddy PG. Histopathological study of stomatitis nicotina. Br J Cancer. 1971 Sep;25(3): 403-10.
10. Pavlidis P, Gouveris C, Kekes G, Maurer J. Changes in electrogustometry thresholds, tongue tip vascularization, density and form of the fungiform papillae in smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Aug;271(8): 2325-31.
11. Gurvits GE, Tan A. Black hairy tongue syndrome. World J Gastroenterol. 2014 Aug 21;20(31): 10845-50.
12. Schlage WK, Iskandar AR, Kostadinova R, Xiang Y, Sewer A, Majeed S, Kuehn D, Frentzel S, Talikka M, Geertz M et al. In vitro systems toxicology approach to investigate the effects of repeated cigarette smoke exposure on human buccal and gingival organotypic epithelial tissue cultures. Toxicol Mech Methods. 2014 Oct;24(7): 470-87.
13. Sand L, Wallström M, Hirsch JM. Smokeless tobacco, viruses and oral cancer. Oral Health Dent Manag. 2014 Jun;13(2): 372-8.
14. Lyons DC, Yazdi I. The carcinogenic potentials of 'opium smoker's tongue'. J Oral Med. 1969 Jul-Oct;24(3): 67-72.
15. Zarea I, Ben Taazayet S, Dakhli I, Chelly I, Mokni M, Zitouna M, Ben Osman A. Squamous cell carcinoma of the lip: a report of 30 cases. Tunis Med. 2013 Feb;91(2): 144-9.
16. Perry BJ, Zammit AP, Dragovic AS et al. Sites of Origin of Oral Cavity Cancer in Nonsmokers vs Smokers: Possible Evidence of Dental Trauma Carcinogenesis and Its Importance Compared With Human Papillomavirus. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Jan 1;141(1): 5-11.
17. Singh M, Sircar K, Tandon A, Chowdhry A, Popli DB. The role of tobacco as an etiological agent for oral cancer: Cytomorphometrical analysis of the buccal mucosa in tobacco users. Dent Res J (Isfahan). 2014 Nov;11(6): 649-55.
18. Janbaz KH, Qadir MI, Bassar HT, Bokhari TH, Ahmad B. Risk for oral cancer from smokeless tobacco. Contemp Oncol (Pozn). 2014; 18(3): 160-4.
19. Kim KS. No Smoking Activities of Korean Dental Association. J Korean Dental Association. 2010 May;48(5): 342-48.
20. Samatha Y, Sai Sankar AJ, Ganapathy K, Srinivas K, Ankineedu D, Choudary AL. Clinicopathologic Evaluation of Lesions associated with Tobacco Usage. J Contemp Dent Pract. 2014 Jul 1;15(4): 466-72.
21. Reddy CR, Sarma PR, Kameswari VR. Oral exfoliative cytology in female reverse smokers having stomatitis nicotina. Acta Cytol. 1975 Jan-Feb; 19(1): 28-31.
22. Kim YJ. Smoking and oral disease. South Korea; Korean Dental Association. 2008.
23. Khan GJ, Mehmood R, Salah-ud-Din, Ihtesham-ul-Haq. Effect of chronic tobacco use on salivary concentrations of sodium and potassium. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2003 Jan-Mar;15(1): 41-4.
24. George A. Zarb, Ulf Lekholm et al. Understanding of the dental implant related to aging and osteoporosis. 1st ed. South Korea: Na-rae Press; 2005. p.232-54.
25. Noh J, Jeon YS, Kim MR. Nicotine Effect in Human Periodontal Ligament(PDL) cells on the Expression of Type I collagen, TIMP-1 and TIMP-2 mRNA In Vitro. The Journal of Korean Dental Association. 1997;35(9):678-84, 1997; 35(10): 798-99.
26. Whelton H, Kingston R, O'Mullane D, Nilsson F. Randomized controlled trial to evaluate tooth stain reduction with nicotine replacement gum during a smoking cessation program. BMC Oral Health. 2012 Jun 13;12: 1472-80.
27. Brook I, Hausfeld JN. Microbiology of acute and chronic maxillary sinusitis in smokers and nonsmokers. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011 Nov;120(11): 707-12.
28. Park GC. Smoking Cessation Program in the Dental Clinic. J Korean Dental Association. 1997; 35(9-12): 1-10.
29. Preber H, Bergstrom J. Effect of cigarette smoking on periodontal healing following surgical therapy. J Clin Periodontol. 1990 May;17(5): 324-8.
30. Park YD, Lauren L. Patton, Kim JH, Kim HY. Smoking prevalence and attitude toward anti-smoking activities among Korean dentists, International Dental Journal, 2010; 61(1): 383-9.
31. Park YD. Proposal for the smoking prevalence among dentists and smoking cessation in 2005. J Korean Dental Association. 2006; 99(10): 647-57.
32. Raes S, Rocci A, Raes F, Cooper L, De Bruyn H, Cosyn J. A prospective cohort study on the impact of smoking on soft tissue alterations around single implants. Clin Oral Implants Res. 2014 May 5. doi: 10.1111/clr.12405.
33. Park KS. The reason to quit smoking after the implant surgery. Koreahealthlog. 2011 May 12. [Internet]. Available from: <http://club.docdocdoc.kr/3289?category=10>
34. Levin L. The Effect of Cigarette Smoking on Dental Implants and Related Surgery. International Journal of Oral Implantology. 2005 December; 14(4): 357-63.
35. SCCP(Scientific Committee on Consumer Products). Opinion on Hydrogen peroxide, in its free form or when released, in oral hygiene products and tooth whitening products. 18 December 2007.
36. Bazzi JZ, Bindo MJ et al. The effect of at-home bleaching and toothbrushing on removal of coffee and cigarette smoke stains and color stability of enamel. J Am Dent Assoc. 2012 May 14;3(5): 1-7.
37. Blanchard D, Rame JP, Louis MY et al. Oropharyngeal cancer. Bull Cancer. 2014 May 1;101(5): 429-37.
38. Ouyang PY, Su Z, Mao YP et al. Prognostic impact of cigarette smoking on the survival of patients with established nasopharyngeal carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013 Dec;22(12): 2285-94.
39. Yoo CH, Lee JS, Kang BC et al. Clinical manifestations of seomyujongjeung

- occurred in the head and neck. *Journal of Otolaryngology* 2013; 56(3): 144-8.
40. Warner DO, Borah BJ, Moriarty J, Schroeder DR, Shi Y, Shah ND. Smoking status and health care costs in the perioperative period: a population-based study. *JAMA Surg.* 2014 Mar;149(3): 259-66.
41. Warner KE, Hodgson TA, Carroll CE. The medical costs of smoking in the United States: Estimates, their validity and their implications. *Tobacco Control* 1999; 4: 380-6.
42. Kim SJ et al. Analysis of the social cost by smoking : of 2006. *Policy Analysis and Evaluation Science Review.* 2006; 18(4): 119-40.
43. Lee SY, Jee SH, Yun JE et al. Medical expenditure of national health insurance attributable to smoking among the Korean population. *J Prev Med Public Health.* 2007; 40(3): 227-32.
44. Park YD, Kang JO, Kim SJ, Kwon HJ, Hwang JH, Hwang KS. Estimation of the costs of smoking-related oral disease: a representative South Korean study. *International Dental Journal.* 2012; 62: 235-40.
45. Neubauer S, Welte R et al. Mortality, morbidity and costs attributable to smoking in Germany: update and 10 year comparison. *Tob Contral* 2006; 15(6): 464-71.
46. FCTC. Guidelines for implementation. Geneva (Switzerland): WHO framework convention on tobacco control; 2013.
47. Hwang JM, Park YD et al. A Study on Effective Smoking Cessation Policy of Smoker Patients. *Journal of Korea Dental Hygiene.* 2013; 13(1): 77-82.
48. Healthlog. Smoking of medical personnel. What do you understand? [Internet]. 2008 May 29. Available from: <http://doc3.koreahealthlog.com/plugin/print/?id=487>
49. Seo HG, Ji SH, Jeon HJ. Smoking Prevalence and Habits of Physicians in Korea: a Mail Questionnaire Survey Conducted in 2000. *J Korean Acad Fam Med.* 2007 Aug;28(8): 599-603.
50. Lee YS. Kukinews[Internet]. [cited 2007 December 3] Available from: <http://media.daum.net/culture/others/newsview?newsid=20071203101508090>
51. Chestnutt IG, Binnie VI. Smoking cessation counselling ; a role for the dental profession. *Br Dent J* 1995; 179: 411-5.
52. Johnson NW, Lowe JC, Warnakulasuriya KA. Tobacco cessation activities of UK dentists in primary care: signs of improvement. *Br Dent J.* 2006 Jan 28;200(2): 85-9.
53. Gorman LM, Lambert PM, Morris HF, Ochi S, Winkler S. The effect of smoking on implant survival at second-stage surgery: DICRG Interim Report No. 5. Dental Implant CLinical Research Group. *Implant Dent.* 1994 Fall;3(3): 165-8.
54. Park YD. Quit smoking program at dental clinic; International conference of asia academy of preventive dentistry. 2008; 8(1): 108-9.
55. Ozkan A, Bayar GR, Altug HA et al. The effect of cigarette smoking on the healing of extraction sockets: an immunohistochemical study. *J Craniofac Surg.* 2014 Jul;25(4): 397-402.